



---

## Fourieranalysis, Übungsblatt 3

Abgabe bis Dienstag, den 24.04.2007, 13:15 Uhr

---

### Aufgabe 1 (2+2 Punkte)

a) Zeigen Sie: Für alle  $f \in L^1_{2\pi}(\mathbb{R})$  und  $x_0 \in \mathbb{R}$  gilt

$$\int_{[x_0, x_0+2\pi]} f \, d\lambda = \int_{[0, 2\pi]} f \, d\lambda.$$

b) Sei  $f \in L^1_{2\pi}(\mathbb{R})$  und  $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  eine Stammfunktion von  $f$ . Zeigen Sie die Äquivalenz der folgenden Aussagen:

- (i)  $F$  ist  $2\pi$ -periodisch.
- (ii) Es gilt  $\hat{f}(0) = 0$ .
- (iii) Es gilt  $\int_{[0, 2\pi]} f(x) \, d\lambda(x) = 0$ .

### Aufgabe 2 (3+2 Punkte)

a) Sei  $\tilde{f} : [-\pi, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$  definiert durch  $\tilde{f}(x) = \frac{\pi}{2} - |x|$  und  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  die  $2\pi$ -periodische Fortsetzung von  $\tilde{f}$ . Berechnen Sie  $\hat{f}(n)$  für alle  $n \in \mathbb{Z}$ .

b) Sei  $\tilde{g} : [-\pi, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$  definiert durch

$$\tilde{g}(x) = \begin{cases} \frac{\pi x + x^2}{2} & \text{für } -\pi \leq x \leq 0, \\ \frac{\pi x - x^2}{2} & \text{für } 0 < x < \pi \end{cases}$$

und  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  die  $2\pi$ -periodische Fortsetzung von  $\tilde{g}$ . Berechnen Sie  $\hat{g}(n)$  für alle  $n \in \mathbb{Z}$ .

### Aufgabe 3 (2+2+2 Punkte)

a) Bestimmen Sie  $\hat{P}$  für jedes trigonometrische Polynom  $P$ .

b) Bestimmen Sie  $\hat{D}_n$  und  $\hat{F}_n$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ .

c) Berechnen Sie für  $f \in L^1_{2\pi}$  und  $n \in \mathbb{N}$  sowohl  $S_n(f, \cdot)$  als auch  $\sigma_n(f, \cdot)$ .

**Aufgabe 4** (3+3 Punkte)

Für  $f, g \in L^1_{2\pi}$  definiere  $f * g$  durch

$$(f * g)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{[-\pi, \pi]} f(t)g(x - t) \, d\lambda(t)$$

für alle  $x \in \mathbb{R}$ , in denen das Integral existiert. ( $f * g$  heißt das (periodische) *Faltungsprodukt* von  $f$  und  $g$ .)

- a) Zeigen Sie, daß für  $f, g \in L^1_{2\pi}$  stets  $f * g \in L^1_{2\pi}$  gilt. Begründen Sie dabei auch, warum  $f * g$  f. ü. in  $\mathbb{R}$  wohldefiniert ist.
- b) Zeigen Sie den *Faltungssatz*:  $(f * g)^\wedge(k) = \hat{f}(k)\hat{g}(k)$  für alle  $f, g \in L^1_{2\pi}$  und  $k \in \mathbb{Z}$ .