Harmonische Analysis, Übungsblatt 9

Wird besprochen am Dienstag, den 26. Juni 2012, 11:45 Uhr

Aufgabe 39 Es sei $G = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{T}$ mit der Gruppenmultiplikation

$$(p, q, r)(x, y, z) = \left(p + x, q + y, rze^{\pi i(py - qx)} \right)$$

für $(p, q, r), (x, y, z) \in G$ die „reduzierte Heisenberggruppe“. Durch $\pi : G \rightarrow U(L^2(\mathbb{R}))$, $\pi(x, y, z)u(t) = ze^{2\pi iyt + \pi ixy}u(t + x)$ wird eine Darstellung definiert.

(a) Zeigen Sie: Für $u, v \in L^2(G)$ gilt $\|C_{u,v}\|^2 = \|u\|^2 \|v\|^2$.

Hinweis: Die Fouriertransformierte einer Funktion $f \in L^1(\mathbb{R})$ wird definiert als

$$\mathcal{F}(f)(\xi) = \hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-2\pi i\xi x} dx.$$

Der Satz von Plancherel besagt die Existenz einer unitären Fortsetzung $\mathcal{P} : L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$ von $\mathcal{F}|_{L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})}$.

(b) Folgern Sie $\pi \in \widehat{G}_d$.

Aufgabe 40 Es sei π eine *irreduzible* Darstellung einer lokalkompakten Gruppe G auf dem Hilbertraum $\mathcal{H}_\pi$ und $\mathcal{H}_0$ ein beliebiger Hilbertraum. Es sei $\sigma : G \rightarrow U(\text{HS}(\mathcal{H}_0, \mathcal{H}_\pi))$, $\sigma(x)A = \pi(x) \circ A$.

(a) Zeigen Sie: Ein Operator $T \in B(\text{HS}(\mathcal{H}_0, \mathcal{H}_\pi))$ ist genau dann in $C(\sigma)$, wenn es ein $S \in B(\mathcal{H}_0)$ gibt mit $T(A) = A \circ S$.

(b) Folgern Sie: Ist π eine irreduzible Darstellung von G und σ eine irreduzible Darstellung einer lokalkompakten Gruppe H , dann ist $\pi \boxtimes \sigma : G \times H \rightarrow U(\text{HS}(\mathcal{H}_\sigma, \mathcal{H}_\pi))$ eine irreduzible Darstellung von $G \times H$.

Aufgabe 41 Es sei G eine kompakte Gruppe. Zeigen Sie $\widehat{G} = \widehat{G}_d$.

Aufgabe 42 Es sei G eine abelsche lokalkompakte Gruppe.

Zeigen Sie die Äquivalenz folgender dreier Aussagen:

(a) $\widehat{G}_d \neq \emptyset$

(b) $\widehat{G}_d = \widehat{G}$

(c) G kompakt