

## 9. Übung zur Vorlesung Topologie

(Abgabe: Freitag, 28.06.2002, bis 11.45 Uhr im Übungskasten)

**Aufgabe 1:** Sei  $A := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in Gl(2, \mathbb{R})$  und auf  $\mathbb{R}^2$  sei die Äquivalenzrelation  $R$  definiert durch

$$(x, y) \in R \iff x = y \vee x = Ay \quad (x, y \in \mathbb{R}^2).$$

- a) Zeigen Sie, dass es eine bijektive Abbildung von  $\mathbb{R}^2/R$  auf die Menge der ungeordneten Paare  $\{x_1, x_2\}$  mit  $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$  gibt.
- b) Sei  $Q := \{(x_1, x_2)^t \in \mathbb{R}^2; x_1 \leq x_2\}$  mit der Relativtopologie von  $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_{nat})$  und  $\mathbb{R}^2/R$  mit der Quotiententopologie bezüglich  $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_{nat})$  versehen. Zeigen Sie:

$$f : Q \rightarrow \mathbb{R}^2/R, x \mapsto f(x) := [x]_R, x \in Q$$

ist ein Homöomorphismus.

**Aufgabe 2:** Seien  $[0, 1] \subset \mathbb{R}$  und  $\mathbb{R}^n$  jeweils mit der natürlichen Topologie versehen,  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$  stetig und  $A \subset \mathbb{R}^n$ . Zeigen Sie: Ist  $f(0) \in A$  und  $f(1) \in \mathbb{R}^n \setminus A$ , so gibt es ein  $t_0 \in [0, 1]$  mit  $f(t_0) \in \partial A$ .

**Aufgabe 3:** In einem topologischen Raum  $\underline{X}$  nennt man  $A \subset X$  eine **Zerlegungsmenge** von  $X$ , falls  $A$  offen und abgeschlossen ist. Für  $x \in X$  heißt

$$Q(x) := \bigcap \{A \in \mathcal{P}(X); x \in A, A \text{ Zerlegungsmenge von } X\}$$

die **Quasikomponente** von  $x$ . Zeigen Sie:

- a) Für jedes  $x \in X$  ist  $Q(x)$  abgeschlossen in  $\underline{X}$ .
- b)  $X = \bigcup_{x \in X} Q(x)$  und für  $x, y \in X$  gilt entweder  $Q(x) = Q(y)$  oder  $Q(x) \cap Q(y) = \emptyset$ .
- c) Für jedes  $x \in X$  gilt  $C(x) \subset Q(x)$ .
- d)  $C(x)$  ist genau dann offen, wenn  $Q(x)$  offen ist. In diesem Fall gilt  $C(x) = Q(x)$ .

**Aufgabe 4:** Sei  $\underline{X}$  ein topologischer Raum. Bestimmen Sie die Zusammenhangskomponenten von  $\underline{X}$  in den folgenden Fällen:

- a)  $\mathcal{T} = \mathcal{T}_A = \{U \subset X; A \subset U \text{ oder } U = \emptyset\}$  für  $A \subset X$ .
- b)  $\mathcal{T} = \mathcal{T}_\mathcal{P}$  ist eine Partitionstopologie auf  $X$ .